

様

年 月 日







## アバスチン／XELOX療法

この治療では次の3種の薬を使用します。

- ペバシズマブ（アバスチン注）：血管新生を妨げて効果を現します。
- オキサリプラチン（エルプラット注）：細胞のDNAや蛋白合成を妨げ効果を現す。
- カベシタピン（ゼローダ錠）：細胞のDNAやRNAの合成を妨げ効果を現す。

<投与スケジュール> …… 3週間 1コース

今回 コース目

<薬品名> <投与方法・時間>	<薬の作用>	1コース目			2コース目
		1日目	2日目	14日目	22日目
ゲラニセロン・デキサト・輸液 <点滴30分>	吐き気止め、アレルギー予防		休薬		
アバスチン・輸液 <点滴30分>	化学療法剤		休薬		
エルプラット 5%ブドウ糖液250mL <点滴2時間>	化学療法剤		休薬		
ゼローダ <内服14日間> <休薬7日間>	化学療法剤			休薬	

### <薬剤投与日の注意>

- ★ 点滴部位が痛くなったり、腫れたりした場合や点滴が落ちなくなった場合は、薬液が血管外へ漏れていることがありますので、すぐに申し出てください。
- ★ 薬剤の投与は、血液検査やその他必要な検査を行いながら進めていきます。副作用の発現・合併症の有無によって治療の途中でも、薬剤の減量・変更や中止されることがあります。

<備考>