

項目名		性別	基準値下限値	基準値上限値	単位
生化学検査					
血糖			70 以上	109 以下	mg/dl
HbA1c	JDS		4.3 以上	5.8 以下	%
	NGSP		4.6 以上	6.2 以下	%
CRP				0.3 以下	mg/dl
総蛋白			6.7 以上	8.3 以下	g/dl
アルブミン			3.8 以上	5.3 以下	g/dl
A/G比			1.1 以上	2.3 以下	
AST(GOT)			8 以上	38 以下	U/l
ALT(GPT)			4 以上	44 以下	U/l
ALP-IFCC			38 以上	113 以下	U/l
LDH-IFCC			106 以上	211 以下	U/l
γ-GTP			16 以上	73 以下	U/l
Ch-E			229 以上	521 以下	U/l
総ビリルビン			0.2 以上	1.2 以下	mg/dl
直接ビリルビン				0.4 以下	mg/dl
CK	男性		56 以上	244 以下	U/l
	女性		43 以上	165 以下	U/l
CK-MB				15 以下	U/l
アミラーゼ			41 以上	112 以下	U/l
膵型-アミラーゼ			18 以上	53 以下	U/l
尿素窒素			8 以上	20 以下	mg/dl
クレアチニン	男性		0.6 以上	1.1 以下	mg/dl
	女性		0.4 以上	0.8 以下	mg/dl
尿酸	男性		3 以上	7 以下	mg/dl
	女性		2 以上	7 以下	mg/dl
24時間-Ccr			76 以上	140.3 以下	ml/min
推定GFR					ml/min
ナトリウム			135 以上	145 以下	mEq/l
カリウム			3.3 以上	4.8 以下	mEq/l
クロール			97 以上	107 以下	mEq/l
カルシウム			8.8 以上	10.2 以下	mg/dl
無機リン			2.5 以上	4.5 以下	mg/dl
マグネシウム			1.8 以上	2.4 以下	mg/dl
鉄			65 以上	157 以下	μg/dl
不飽和鉄結合能			191 以上	269 以下	μg/dl
総鉄結合能					μg/dl
総コレステロール			130 以上	220 以下	mg/dl
中性脂肪			50 以上	150 以下	mg/dl

HDLコレステロール		男性	35.3 以上	79.5 以下	mg/dl
		女性	42 以上	88 以下	mg/dl
LDLコレステロール			70 以上	139 以下	mg/dl
IgG			870 以上	1700 以下	mg/dl
IgA			110 以上	410 以下	mg/dl
IgM			35 以上	220 以下	mg/dl
高感度	濃度			26.2 以下	pg/ml
トポロニン I	判定		陰性	陰性	
BNP				18.4 以下	pg/ml
フェリチン		男性	39.4 以上	340 以下	ng/ml
		女性	3.6 以上	114 以下	ng/ml
アルコール					
尿-AMY			30 以上	950 以下	U/l
尿-Na			130 以上	260 以下	mEq/l
尿-K			30 以上	100 以下	mEq/l
尿-CL			110 以上	260 以下	mEq/l
尿-Ca					mg/dl
尿-IP					mg/dl
尿-Mg					mg/dl
尿ALP-IFCC					U/l
アンモニア			15 以上	56 以下	μ g/dl
血清浸透圧			270 以上	295 以下	mOsm/l
尿-浸透圧			50 以上	1300 以下	mOsm/l
蓄尿-Na			130 以上	260 以下	mEq/l
蓄尿-K			30 以上	100 以下	mEq/l
蓄尿-CL			110 以上	260 以下	mEq/l
コルチゾール			3.7 以上	19.4 以下	μ g/dl
尿中ミオグロビン				10 以下	ng/ml
リパーゼ			5 以上	35 以下	U/l

免疫血清学検査					
hCG				6 以下	mIU/ml
FT3		2.3 以上		4.1 以下	pg/ml
FT4		0.7 以上		1.7 以下	ng/dl
TSH		0.5 以上		4.3 以下	μ IU/ml
CEA		以上		5 以下	ng/ml
AFP		以上		10 以下	ng/ml
CA19-9		以上		37 以下	U/ml
CA125				35 以下	U/ml
PIVKA2				39 以下	mAU/ml

PSA			4 以下	ng/ml
CA15-3 (院内)			25 以下	U/ml
E2 (院内)				pg/ml
プロカルスチン(PCT)			0.5 未満	ng/ml
PTH-I (迅速)		15 以上	68.3 以下	pg/ml
パソマイシン		10 以上	15 以下	μg/ml
ジゴキシン		0.5 以上	0.8 以下	ng/ml
シクロスポリン				ng/ml
タクロリムス		5 以上	20 以下	ng/ml
メトトレキサート				μmol/l
ATLA-Ab			0.9 以下	
HBsAg (抗原)	判定-HQ		陰性	陰性
	濃度-HQ			0.004 以下 IU/ml
HBsAb (抗体)	判定		陰性	陰性
	抗体価			9.9 以下 mIU/ml
HCVAb (抗体)	判定		陰性	陰性
	S/CO			0.9 以下 CO.I
HIV1.2Ab (抗体)	判定		陰性	陰性
	S/CO			0.9 以下 CO.I
RPR	判定		陰性	陰性 以下
	濃度			0.9 以下
TPLA	判定		陰性	陰性
	濃度			4.9 以下 U/ml
HBV-DNA定量				検出せず
HBc抗体				検出せず
HIV-1抗体(確認試験)				検出せず
HIV-2抗体(確認試験)				検出せず

血液学検査					
CBC	白血球数		3500 以上	9000 以下	/μl
	赤血球数	男性	410 以上	550 以下	×10 ⁴ /μl
		女性	360 以上	490 以下	×10 ⁴ /μl
	ヘモグロビン	男性	13.0 以上	17.4 以下	g/dl
		女性	11.0 以上	15 以下	g/dl
	ヘマトクリット値	男性	39.8 以上	51.8 以下	%
		女性	32.8 以上	44.8 以下	%
	MCV		85 以上	105 以下	fl
	MCH		28 以上	35 以下	pg
	MCHC		31 以上	35.5 以下	%
血小板数		12 以上	35 以下	×10 ⁴ /μl	

網状赤血球数			0.2 以上	2 以下	%
血液像	好中球		40 以上	75 以下	%
	リンパ球		20 以上	50 以下	%
	単球		1 以上	以下	%
	好酸球			7 以下	%
	好塩基球			2 以下	%
	Blast				%
	Promyelo				%
	Myelo				%
	Meta				%
	Band			6 以下	%
	Seg		35 以上	75 以下	%
	Lymp		20 以上	50 以下	%
	Mono		1 以上	10 以下	%
	Eosi			7 以下	%
Baso			2 以下	%	
血沈	血沈-30	男性	1.0 以上	5 以下	mm
		女性	2.0 以上	7 以下	mm
	血沈-60	男性	2.0 以上	10 以下	mm
		女性	3.0 以上	15 以下	mm
	血沈-120	男性	3.0 以上	15 以下	mm
		女性	5.0 以上	17 以下	mm
FLT3遺伝変異				検出せず	
抗核抗体(ANA)			40 未満		
抗好中球細胞質抗体(PR3-ANCA)			3.5 未満		IU/ml
抗好中球細胞質MPO抗体(MPO-ANCA)			2.0 未満		IU/ml
リウマチ因子(RF)定量				15 以下	IU/ml

凝固検査					
PT	PT(秒)		10 以上	14 以下	秒
	PT(%)		77 以上	104 以下	%
	PT-INR		0.9 以上	1.1 以下	
APTT			20 以上	40 以下	秒
フィブリンゲン			200 以上		mg/dl
FDP				10 以下	μ g/ml
Dダイマー				1 以下	μ g/ml
AT3活性			81 以上	123 以下	%

一般検査					
尿定性	比重		1.002 以上	1.030 以下	
	潜血				
	pH		5.0 以上	7.5 以下	
	白血球				
	蛋白				
	糖				
	ウビリゲン				
	ビリルビン				
亜硝酸塩					
尿蛋白定量			以上	10 以下	mg/dl
尿糖定量			以上	20 以下	mg/dl
蓄尿蛋白定量			20 以上	120 以下	mg/day
蓄尿糖定量			40 以上	85 以下	mg/day
尿妊娠反応定性					
髄液	比重		1.005 以上	1.007 以下	
	単核		以上		
	多核		以上		
	髄-蛋白		10 以上	40 以下	mg/dl
	髄-糖		40 以上	75 以下	mg/dl
	髄-CL		120 以上	125 以下	mEq/l
	髄-LDH				U/l
便中Hb	便中ヘモグロビン			49 以下	ng/ml
	判定		陰性	陰性	