

様

年 月 日

BIW DTX+CBDCA (トセタキセルとカルボプラチン併用)療法

この治療では次の2種の薬を使用します。

トセタキセル (タキソテール注) : 細胞の分裂を抑えて病気の細胞が増えるのを抑えます。

カルボプラチン注 : 細胞のDNAに作用し効果を現す。

<投与スケジュール> . . . 2週間 1コース 今回 コース目

<薬品名> <投与方法・時間>	<薬の作用>	1コース目			2コース目
		1日目	15日目	15日目
テキサト注・グラセトロン注 <点滴 30分>	7L7キ- - 嘔気の予防		休薬		
トセタキセル (タキソテール) 生食250ml <点滴 1時間>	化学療法剤		休薬		
カルボプラチン 5%ブドウ糖250ml <点滴 1.5時間>	化学療法剤		休薬		

<薬剤投与日の注意>

- ★ 点滴部位が痛くなったり、腫れたりした場合や点滴が落ちなくなった場合は、薬液が血管外へ漏れていることがありますので、すぐに申し出てください。
- ★ 投与開始後、7L7キ-症状が現れることがあります。息苦しさや胸の痛み、脈の乱れ、顔の火照り、発汗異常、低血圧、かゆみ、発疹などの不快症状があればすぐに申し出てください。
- ★ ドセタキセル注にはアルコールが含まれています。アルコールにアレルギーがある方やお酒に弱い方は、予め申し出てください。
- ★ 薬剤の投与は、血液検査やその他必要な検査を行いながら進めていきます。副作用の発現・合併症の有無によって治療の途中でも、薬剤の減量・変更や中止されることがあります。

<備考>