

様

年 月 日

アバスチン／XELOX療法

この治療では次の3種の薬を使用します。

- ペバシズマブ（アバスチン注）：血管新生を妨げて効果を現します。
- オキサリプラチン（エルプラット注）：細胞のDNAや蛋白合成を妨げ効果を現す。
- カベシタピン（ゼローダ錠）：細胞のDNAやRNAの合成を妨げ効果を現す。

<投与スケジュール> …… 3週間 1コース

今回 コース目

| <薬品名> <投与方法・時間> | <薬の作用> | 1コース目 | | | 2コース目 |
|-----------------------------|---------------|---|-----|------|---|
| | | 1日目 | 2日目 | 14日目 | 22日目 |
| ゲラニセロン・デキサト・輸液 <点滴30分> | 吐き気止め、アレルギー予防 |  | 休薬 | |  |
| アバスチン・輸液 <点滴30分> | 化学療法剤 |  | 休薬 | |  |
| エルプラット 5%ブドウ糖液250mL <点滴2時間> | 化学療法剤 |  | 休薬 | |  |
| ゼローダ <内服14日間> <休薬7日間> | 化学療法剤 |  | | 休薬 |  |

<薬剤投与日の注意>

- ★ 点滴部位が痛くなったり、腫れたりした場合や点滴が落ちなくなった場合は、薬液が血管外へ漏れていることがありますので、すぐに申し出てください。
- ★ 薬剤の投与は、血液検査やその他必要な検査を行いながら進めていきます。副作用の発現・合併症の有無によって治療の途中でも、薬剤の減量・変更や中止されることがあります。

<備考>