

<形成外科>

2025/12/26

| レジメン名称 | 薬品名 | 数量 | 単位 | 投与日 | 休薬完了日 |
|--------------------------|-------|----|---------|------|-------|
| オブジーボ+ヤーボイ（メラノーマ） 4クールまで | オブジーボ | 80 | m g | day1 | 21 |
| | ヤーボイ | 3 | m g /kg | day1 | |
| バベンチオ単剤 | バベンチオ | 10 | m g /kg | day1 | 21 |

<整形外科>

| レジメン名称 | 薬品名 | 数量 | 単位 | 投与日 | 休薬完了日 |
|---------------------------|--------------|-------|---------------------|----------------|-------|
| 45) IFO+DXR | ドキソルビシン | 30 | m g /m ² | day1,2 | 21 |
| | イホマイド | 2 | g /m ² | day1,2,3,4,5 | |
| 45) DXR3日間 | ドキソルビシン | 30 | m g /m ² | day1,2,3 | 21 |
| 45) NECO95J(CDDP+DXR) | シスプラチン | 120 | m g /m ² | day1 | 21 |
| | ドキソルビシン | 30 | m g /m ² | day1,2 | |
| 45) NECO95J(IFO7日間) | イホマイド | 4 | g /m ² | day1 | 21 |
| | | 2 | g /m ² | day2,3,4,5,6,7 | |
| 45) NECO95J(MTX) | メソトレキセート(大量) | 10000 | m g /m ² | day1 | 7 |
| Bi-weeklyユーイング肉腫(VDC)療法2W | ドキソルビシン | 37.5 | m g /m ² | day1,2 | 14 |
| | エンドキサン | 1200 | m g /m ² | day1 | |
| | オンコビン | 1.5 | m g /m ² | day1 | |
| ヨンデリス単剤療法 | ヨンデリス | 1.2 | m g /m ² | day1 | 21 |
| 45) NECO95J(IFO 5日間) | イホマイド | 4 | g /m ² | day1 | 21 |
| | | 2 | g /m ² | day2,3,4,5 | |
| GEM/DTX（肉腫） | ゲムシタピン | 675 | m g /m ² | day1,8 | 21 |
| | ドセタキセル | 75 | m g /m ² | day8 | |
| VAC療法 | エンドキサン | 2200 | m g /m ² | day1 | 21 |
| | オンコビン | 1.5 | m g /m ² | day1,8,15 | |
| | コスメゲン | 0.045 | m g /kg | day1 | |
| VI療法（JRSG） | イリノテカン | 50 | m g /m ² | day1,2,3,4,5 | 21 |
| | オンコビン | 1.5 | m g /m ² | day1,8,15 | |
| DXR単剤（1日） | ドキソルビシン | 75 | m g /m ² | day1 | 21 |
| 45) ユーイング肉腫(IE) | イホマイド | 1.8 | g /m ² | day1,2,3,4,5 | 21 |
| | エトポシド | 100 | m g /m ² | day1,2,3,4,5 | |
| 45) ユーイング肉腫(VDC) | ドキソルビシン | 37.5 | m g /m ² | day1,2 | 21 |
| | エンドキサン | 1200 | m g /m ² | day1 | |
| | オンコビン | 1.5 | m g /m ² | day1 | |

<皮膚科>

| レジメン名称 | 薬品名 | 数量 | 単位 | 投与日 | 休薬完了日 |
|-------------------|---------|-----|---------------------|--------------|-------|
| CA療法 | シスプラチン | 60 | m g /m ² | day1 | 21 |
| | ドキソルビシン | 20 | m g /m ² | day2 | |
| 44)DAC-Tam療法（5日間） | シスプラチン | 85 | m g /m ² | day1 | 28 |
| | ダカルバジン | 150 | m g /m ² | day2,3,4,5 | |
| | ニドラン | 50 | m g /m ² | day2 | |
| | タモキシフェン | 20 | mg | 連日服用 | |
| 44)ダカルバジン単独（5日間） | ダカルバジン | 150 | m g | day1,2,3,4,5 | 21 |