

<腫瘍内科・消化器外科>

2025/12/26

胃癌

レジメン名称	薬品名	数量	単位	投与日	休薬完了日
P-101 PTX (3weeks)	パクリタキセル	180	mg /m ²	day1	21
P-102 weeklyPTX	パクリタキセル	80	mg /m ²	day1,8,15	21
D-101 DTX	ドセタキセル	60	mg /m ²	day1	15
11)CDDP・TS-1療法(Short hydration)	シスプラチニン	60	mg /m ²	day8	
	S-1 (3投2休)	体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ～1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1夕～22朝、分2	35
L-OHP + S-1 (G-SOX)	オキサリプラチニン	100	mg /m ²	day1	
	S-1 (2投1休)	体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ～1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1夕～15朝、分2	21
RAM単剤	サイラムザ	8	mg /kg	day1	14
weekly PTX + RAM	サイラムザ パクリタキセル	8 80	mg /kg mg /m ²	day1,15 day1,8,15	28
weekly nabPTX	アブラキサン	100	mg /m ²	day1,8,15	28
RAM+weekly nabPTX	サイラムザ アブラキサン	8 100	mg /kg mg /m ²	day1,15 day1,8,15	28
11)CDDP・CPT-11療法(CDDP分割)	イリノテカント シスプラチニン	70 30	mg /m ² mg /m ²	day1,15 day1,15	26
X P + ト拉斯ツズマブ	シスプラチニン ト拉斯ツズマブBS	80 (初回 8) 6	mg /m ² mg /kg	day1 day1	
	カベシタビン (2投1休)	体表面積 1.36m ² 未満 2400 1.36m ² ～1.65m ² 3000 1.66m ² ～1.95m ² 3600 1.96m ² 以上 4200	mg/day	day1夕～15朝、分2	21
ト拉斯ツズマブ デルクステカン (胃がん)	エンハーツ	6.4	mg /kg	day1	21
オブジーボ単剤 (240mg 2週間隔)	オブジーボ	240	mg	day1	14
オブジーボ単剤 (480mg 4週間隔)	オブジーボ	480	mg	day1	28
SOX+オブジーボ	オキサリプラチニン オブジーボ	130 360	mg /m ² mg /body	day1 day1	
	S-1 (2投1休)	体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ～1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1夕～15朝、分2	21
CapeOX+オブジーボ	オブジーボ オキサリプラチニン	360 130	mg/day mg /m ²	day1 day1	
	カベシタビン (2投1休)	体表面積 1.36m ² 未満 2400 1.36m ² ～1.65m ² 3000 1.66m ² ～1.95m ² 3600 1.96m ² 以上 4200	mg/day	day1夕～15朝、分2	21
(治) weekly PTX + RAM	(治) パクリタキセル (治) ラムシルマブ	80 8	mg /m ² mg /kg	day1,8,15 day1,15	28
weekly PTX + ト拉斯ツズマブ	ト拉斯ツズマブB S パクリタキセル	4 80	mg /kg mg /m ²	day1,15 day1,8,15	28
FOLFOX+ ト拉斯ツズマブ	オキサリプラチニン ト拉斯ツズマブB S フルオロウラシル	85 4 400 2400	mg /m ² mg /kg mg /m ²	day1 day1 day1 day1～2 (46時間持続)	14
ト拉斯ツズマブ併用療法	ト拉斯ツズマブB S	6	mg /kg	day1	21
ティーエスワン+ト拉斯ツズマブ併用療法	ト拉斯ツズマブB S	6	mg /kg	day1,22	42
ト拉斯ツズマブ+G-SOX	オキサリプラチニン ト拉斯ツズマブB S	100 6	mg /m ² mg /kg	day1 day1	
	S-1 (2投1休)	体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ～1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1夕～15朝、分2	21

11) DTX/S-1★ (2~7サイクル)	ドセタキセル S-1 (2投1休)	40 体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ~1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	m g /m ² m g /day	day1 2投1休、day1夕~15朝、分2	21
(試) FLTAX療法	パクリタキセル フルオロウラシル	60 500	m g /m ² m g /m ²	day1,8,15 day1,8,15	28 28
(試) サイラムザ+ロンサーフ	サイラムザ	8	m g /kg	day1,15	28
SOX+ビロイ (1コース目)	オキサリプラチナ ビロイ S-1 (2投1休)	130 (初回800) 800 体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ~1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	m g /m ² m g /m ² mg/day	day2 day1 day2夕~16朝、分2	21
SOX+ビロイ (2コース目以降)	オキサリプラチナ ビロイ S-1 (2投1休)	130 600 体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ~1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	m g /m ² m g /m ² mg/day	day1 day1 day1夕~15朝、分2	21
CAPOX+ビロイ (1コース目)	オキサリプラチナ ビロイ カベシタビン (2投1休)	130 (初回800) 800 体表面積 1.36m ² 未満 2400 1.36m ² ~1.65m ² 3000 1.66m ² ~1.95m ² 3600 1.96m ² 以上 4200	m g /m ² m g /m ² mg/day	day2 day1 day2夕~16朝、分2	21
CAPOX+ビロイ (2コース目以降)	オキサリプラチナ ビロイ カベシタビン (2投1休)	130 600 体表面積 1.36m ² 未満 2400 1.36m ² ~1.65m ² 3000 1.66m ² ~1.95m ² 3600 1.96m ² 以上 4200	m g /m ² m g /m ² mg/day	day1 day1 day1夕~15朝、分2	21
FOLFOX+ビロイ (1コース目)	フルオロウラシル オキサリプラチナ ビロイ	400 2400 85 (初回800) 800 体表面積 1.36m ² 未満 2400 1.36m ² ~1.65m ² 3000 1.66m ² ~1.95m ² 3600 1.96m ² 以上 4200	m g /m ² m g /m ² m g /m ² m g /m ²	day2 day2 (46時間持続) day2 day1 day1 day1 day1 day1	14
FOLFOX+ビロイ (2コース目以降)	フルオロウラシル オキサリプラチナ ビロイ	400 2400 85 400 体表面積 1.36m ² 未満 2400 1.36m ² ~1.65m ² 3000 1.66m ² ~1.95m ² 3600 1.96m ² 以上 4200	m g /m ² m g /m ² m g /m ² m g /m ²	day1 day1 (46時間持続) day1 day1	14
CAPOX+トラスツズマブ+キイトルーダ	キイトルーダ トラスツズマブB S オキサリプラチナ カベシタビン (2投1休)	200 (初回 8) 6 130 2000 体表面積 1.36m ² 未満 2400 1.36m ² ~1.65m ² 3000 1.66m ² ~1.95m ² 3600 1.96m ² 以上 4200	m g /kg m g /day	day1 day1 day1 day1~14、分2	21

大腸癌

レジメン名称	薬品名	数量	単位	投与日	休薬完了日
FOLFOX+オプジー ^ボ	オキサリプラチン	85	m g /m ²	day1	14
	オプジー ^ボ	240	m g	day1	
	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	
11)sLV5FU2	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	7
sLV5FU2+ ^ベ ケティ ^ビ ックス併用療法	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	14
	ベクティビックス	6	m g /kg	day1	
	オキサリプラチン	85	m g /m ²	day1	
mFOLFOX6	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	14
	オキサリプラチン	85	m g /m ²	day1	
	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	
mFOLFOX6+ ^ベ ケティ ^ビ ックス併用療法	ベクティビックス	6	m g /kg	day1	14
	イリノテカン	150	m g /m ²	day1	
	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	
11)FOLFIRI	イリノテカン	150	m g /m ²	day1	14
	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	
	ベクティビックス	6	m g /kg	day1	
FOLFIRI+ ^ベ ケティ ^ビ ックス併用療法	イリノテカン	150	m g /m ²	day1	14
	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	
	ベクティビックス	6	m g /kg	day1	
FOLFIRI+RAM併用療法	イリノテカン	150	m g /m ²	day1	14
	サイラムザ	8	m g /kg	day1	
	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	
FOLFIRI+Aflibercept療法	イリノテカン	150	m g /m ²	day1	14
	ザルトラップ	4	m g /kg	day1	
	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	
mFOLFOXIRI	イリノテカン	150	m g /m ²	day1	14
	オキサリプラチン	85	m g /m ²	day1	
	フルオロウラシル	2400	m g /m ²	day1	
s LV5FU2+ ^ベ ケティ ^ビ ックス併用療法	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	14
	ベバシズマブBS	5	m g /kg	day1	
	オキサリプラチン	85	m g /m ²	day1	
mFOLFOX6+ ^ベ ケティ ^ビ ックス併用療法	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	14
	ベバシズマブBS	5	m g /kg	day1	
	イリノテカン	150	m g /m ²	day1	
FOLFIRI+ ^ベ ケティ ^ビ ックス併用療法	フルオロウラシル	400 2400	m g /m ² m g /m ²	day1 day1~2 (46時間持続)	14
	ベバシズマブBS	5	m g /kg	day1	
	イリノテカン	150	m g /m ²	day1	
mFOLFOXIRI+ ^ベ ケティ ^ビ ックス併用療法	オキサリプラチン	85	m g /m ²	day1	14
	フルオロウラシル	2400	m g /m ²	day1	
	ベバシズマブBS	5	m g /kg	day1	
XELOX療法	オキサリプラチン	130	m g /m ²	day1	21
	カペシタビン (2投1休)	1.36m ² 未満 1.36m ² ~1.65m ² 1.66m ² ~1.95m ² 1.96m ² 以上	2400 3000 3600 4200	m g /day	
	カペシタビン (2投1休)	1.36m ² 未満 1.36m ² ~1.65m ² 1.66m ² ~1.95m ² 1.96m ² 以上	2400 3000 3600 4200	m g /day	
^ベ ケティ ^ビ ックス単剤	ベクティビックス	6	m g /kg	day1	14
11)IRIS★	イリノテカン	125	m g /m ²	day1,15	28
	S-1 (2投2休)	<1.25m ² 未満 1.25m ² ~1.5m ² 1.5m ² 以上	80 100 120	m g /day	
	S-1 (2投2休)	<1.25m ² 未満 1.25m ² ~1.5m ² 1.5m ² 以上	80 100 120	m g /day	
CPT-11単独療法 (max180m g /m ²)	イリノテカン	150	m g /m ²	day1	14
イリノテカン+ ^ベ ケティ ^ビ ックス併用療法	イリノテカン ベクティビックス	150 6	m g /m ² m g /kg	day1 day1	14
アービ ^タ ックス+ビ ^ラ フトビ ⁺ +メクトビ ⁺	アービ ^タ ックス ビ ^ラ フトビ ⁺ メクトビ ⁺	(初回400) 250 300 90	m g /m ² m g /day m g /day	day1 day1~7	7
バージェタ+ハーセプチ ^ン (大腸癌)	ハーセプチ ^ン バージェタ	6 420	m g /kg m g	day1 day1	21

XELOX + ベバシズマブ (7.5mg/kg)併用療法	ベバシズマブBS オキサリプラチン	7.5 130	mg/kg mg/m ²	day1 day1	21
	カペシタビン (2投1休)	体表面積 1.36m ² 未満 2400 1.36m ² ～1.65m ² 3000 1.66m ² ～1.95m ² 3600 1.96m ² 以上 4200	mg/day	day1夕～15朝、分2	
セロダ + ベバシズマブ (7.5mg/kg)併用療法	ベバシズマブBS	7.5	mg/kg	day1	21
	カペシタビン (2投1休)	体表面積 1.36m ² 未満 2400 1.36m ² ～1.65m ² 3000 1.66m ² ～1.95m ² 3600 1.96m ² 以上 4200	mg/day	day1夕～15朝、分2	
S-1 + ベバシズマブ併用療法 (BASIC)	ベバシズマブBS	5	mg/kg	day1,15,29	42
ロンサーフ+BV療法	ベバシズマブBS	5	mg/kg	day1,15	28
	ロンサーフ	体表面積 1.07m ² 未満 70 1.07m ² ～1.23m ² 80 1.23m ² ～1.38m ² 90 1.38m ² ～1.53m ² 100 1.53m ² ～1.69m ² 110 1.69m ² ～1.84m ² 120 1.84m ² ～1.99m ² 130 1.99m ² ～2.15m ² 140 2.15m ² 以上 150	mg/day	day1～5、day8～12	
IRIS + ベバシズマブ併用療法★	ベバシズマブBS イリノテカン	5 100	mg/kg mg/m ²	day1,15 day1,15	28
	S-1 (2投2休)	体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ～1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1夕～15朝 分2	
ゲムシタビン+イリノテカン療法	イリノテカン ゲムシタビン	100 1000	mg/m ² mg/m ²	day1,8 day1,8	21
SOX + Cetuximab療法	オキサリプラチン アービタックス	130 250	mg/m ² mg/m ²	day1 day1,8,15	21
	アービタックス療法	250	mg/m ²	day1	
mFOLFOX6+アービタックス併用療法	オキサリプラチン	85	mg/m ²	day1	14
	フルオロウラシル	400	mg/m ²	day1	
	アービタックス	2400 250	mg/m ² mg/m ²	day1～2 (46時間持続) day1,8	
SLV5FU2+アービタックス併用療法	フルオロウラシル	400 2400	mg/m ² mg/m ²	day1 day1～2 (46時間持続)	14
	アービタックス	(初回400) 250	mg/m ²	day1,8	
FOLFIRI+アービタックス併用療法	イリノテカン	150	mg/m ²	day1	14
	フルオロウラシル	400 2400	mg/m ² mg/m ²	day1 day1～2 (46時間持続)	
	アービタックス	250	mg/m ²	day1,8	
アービタックス/イリノテカン (隔週7週1ケル) 療法	イリノテカン アービタックス	150 250	mg/m ² mg/m ²	day1,15,29 day1,8,15,22,29,36,43	48
	イリノテカン+セツキシマブ (隔週2週1ケル)	150 250	mg/m ² mg/m ²	day1 day1,8	
(試) ベバシズマブ (7.5mg/kg) + SOX併用療法	オキサリプラチン ベバシズマブBS	130 7.5	mg/m ² mg/kg	day1 day1	21
	イリノテカン ベバシズマブBS	150 7.5	mg/m ² mg/kg	day1 day1	
Bi-weekly XELIRI+Bevacizumab療法	ベバシズマブBS イリノテカン カペシタビン (1投1休)	10 150 2000	mg/kg mg/m ² mg/日	day1 day1 day1夕～8朝、分2	14
	ペクティビックス イリノテカン	6 100	mg/kg mg/m ²	day1,15 day1,15	
	S-1 (2投2休)	体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ～1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1夕～15朝 分2	
(試) FOLFOXIRI+セツキシマブ 療法	イリノテカン オキサリプラチン フルオロウラシル アービタックス	150 85 2400 250	mg/m ² mg/m ² mg/m ² mg/m ²	day1 day1 day1 day1,8	14
	UFT/LV/ベバシズマブ併用療法	ベバシズマブBS	5	mg/kg	day1,15
(試) Tri-weekly XELIRI+ベバシズマブ 療法	イリノテカン ベバシズマブBS	200 7.5	mg/m ² mg/kg	day1 day1	21

食道癌

レジメン名称	薬品名	数量	単位	投与日	休薬完了日
11)FP療法 (JCOG0508) 4日間持続投与	シスプラチニ フルオロウラシル	70 2800	mg/m ² mg/m ²	day1 day1~4 (96時間持続)	28
FP療法 5日間持続投与(q4w)	シスプラチニ フルオロウラシル	80 4000	mg/m ² mg/m ²	day1 day1~5 (120時間持続)	28
11)DCF(5HR) 5日間持続投与	シスプラチニ ドセタキセル フルオロウラシル	70 70 3750	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	day1 day1 day1~5 (120時間持続)	28
11)DCF(JCOG0807)	シスプラチニ ドセタキセル フルオロウラシル	80 30 4000	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	day1 day1,15 day1~5 (120時間持続)	28
FP療法 5日間持続投与(術前q3w)	シスプラチニ フルオロウラシル	80 4000	mg/m ² mg/m ²	day1 day1~5 (120時間持続)	21
FP療法(JCOG1510 化学放射線治療 2コース)	シスプラチニ フルオロウラシル	70 2800	mg/m ² mg/m ²	day1 day1	28
FP療法 (JCOG1510 追加化学療法 2コース)	シスプラチニ フルオロウラシル	80 4000	mg/m ² mg/m ²	day1 day1~5 (120時間持続)	28
DCF療法 (JCOG1510 導入化学療法 3コース)	シスプラチニ ドセタキセル フルオロウラシル	70 70 3750	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	day1 day1 day1~5 (120時間持続)	21
FP (5日間) +キイトルーダ q3w	キイトルーダ シスプラチニ フルオロウラシル	200 80 4000	mg mg/m ² mg/m ²	day1 day1 day1~5 (120時間持続)	21
FP (5日間) +キイトルーダ q3w 7コース目以降	キイトルーダ フルオロウラシル	200 4000	mg mg/m ²	day1 day1~5 (120時間持続)	21
FP +オブジーポ	オブジーポ シスプラチニ フルオロウラシル	240 80 4000	mg mg/m ² mg/m ²	day1,15 day1 day1	28
FP療法 (放射線併用 4日間 外来用)	シスプラチニ フルオロウラシル	70 2800	mg/m ² mg/m ²	day1 day1~4 (96時間持続)	21
FP療法 (5日間 外来用)	シスプラチニ フルオロウラシル	80 4000	mg/m ² mg/m ²	day1 day1~5 (120時間持続)	28
FP +オブジーポ (外来用)	オブジーポ シスプラチニ フルオロウラシル	240 80 4000	mg mg/m ² mg/m ²	day1,15 day1 day1~5 (120時間持続)	28
FP (5日間) +キイトルーダ (外来用 q3w 6コースまで)	キイトルーダ シスプラチニ フルオロウラシル	200 80 4000	mg mg/m ² mg/m ²	day1 day1 day1~5 (120時間持続)	21

肝細胞癌

レジメン名称	薬品名	数量	単位	投与日	休薬完了日
テセントリク+アバスチン（肝細胞癌）	アバスチン テセントリク	15 1200	mg/kg mg	day1 day1	21
イミフィンジ+イジュド（1コース目）	イミフィンジ イジュド	1500 300	mg mg	day1 day1	28

胆道癌

レジメン名称	薬品名	数量	単位	投与日	休薬完了日
CDDP+GEM（胆道癌）併用療法	ゲムシタビン シスプラチニ	1000 25	mg/m ² mg/m ²	day1,8 day1,8	21
GC+イミフィンジ（最大8コースまで）	イミフィンジ ゲムシタビン シスプラチニ	1500 1000 25	mg mg/m ² mg/m ²	day1 day1,8 day1,8	21
イミフィンジ単独（維持、4週間毎）	イミフィンジ	1500	mg	day1	28
ヤーボイ単剤（黒色腫 3mg/kg q3w）	ヤーボイ	3	mg/kg	day1	21
CDDP/GEM併用療法（胆道癌）	ゲムシタビン シスプラチニ	1000 25	mg/m ² mg/m ²	day1,8 day1,8	21
CDDP+GEM+S-1（GCS療法）	シスプラチニ ゲムシタビン S-1（1投1休）	25 1000 <1.25m ² 未満 1.25m ² ～1.5m ² 1.5m ² 以上	mg/m ² mg/m ² 80 100 120	day1 day1 mg/day	14
				day1～7 分2	

膵癌

レジメン名称	薬品名	数量	単位	投与日	休薬完了日
mFOLFIRINOX(膵癌)	イリノテカン オキサリプラチニ フルオロウラシル	150 85 2400	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	day1 day1 day1～2 (46時間持続)	14
na I IRI+5FU/LV	フルオロウラシル オニバイド	2400 70	mg/m ² mg/m ²	day1～2 (46時間持続) day1	14
GEM+nab-PTX療法	ゲムシタビン アブラキサン	1000 125	mg/m ² mg/m ²	day1,8,15 day1,8,15	28
weeklyザノサー（ストレプトゾシン）	ザノサー	1000	mg/m ²	day1	7
11) GEM+S-1	ゲムシタビン S-1（2投1休）	1000 <1.25m ² 未満 1.25m ² ～1.5m ² 1.5m ² 以上	mg/m ² mg/day	day1,8 day1～15朝、分2	21
S-IROX	オキサリプラチニ イリノテカン S-1	85 150 <1.25m ² 未満 1.25m ² ～1.5m ² 1.5m ² 以上	mg/m ² mg/m ² mg/day	day1 day1 day1～7	14
30) weekly GEM	ゲムシタビン	600	mg/m ²	day1	7

肛門管癌

レジメン名称	薬品名	数量	単位	投与日	休薬完了日
(試) S-1/MMC	マイトマイシン10mg	10	mg/m ²	day1	28